

MASSIMO SEMENZATO* - GIANNI ARE**

SULL'AVIFAUNA DELLA CITTA' DI MESTRE
E DELLA SUA CONTERMINAZIONE SUB-URBANA

Abstract

Records of birds from the town of Mestre (Venice) and its suburban area
91 species of birds were identified from researches carried out during the period 1973-1979. The investigated area includes the town of Mestre (Venice), its closest outskirts and surrounding country zones.

Introduzione

Abbiamo qui raccolto le osservazioni ornitologiche, effettuate nella città di Mestre, nella sua periferia e nelle zone rurali circostanti, negli anni che vanno dal 1973 al 1979. L'ambiente delle osservazioni è fortemente antropizzato, ma data l'immediata vicinanza di aree come la Laguna, e nella Terraferma, di piccole «oasi» come i parchi delle ville e le cave di argilla, si registrano presenze interessanti, testimoniate dalla osservazione di varie specie di Ciconiformi e Falconiformi; presenze che potrebbero aumentare se le zone sopra citate fossero salvaguardate e sottratte dall'attuale degrado (imbonimenti, discariche abusive di scorie industriali altamente tossiche ecc.).

Per quanto riguarda l'ordinamento sistematico ci siamo riferiti all'«Elenco degli Uccelli Italiani» di MOLTONI e BRICHETTI (1978).

Descrizione dell'ambiente

Il centro urbano si estende dal vecchio centro storico al porto industriale di Marghera. Qui soltanto i giardini pubblici e privati, assieme ai viali di Tigli e Platani possono ospitare qualche specie ornitica; la situazione ambientale si fa più varia in periferia, dove tra lottizzazioni e vecchie aree agricole, i parchi delle ville (villa Friedenberga ad Asseggiano e villa Matter a Carpe-

Indirizzo degli Autori: * WWF, Calle del Sale, 15 - 30174 Mestre;

** LIPU, Municipio di Mestre, via Palazzo-30174 Mestre.

nedo) e i grossi fossati alberati, composti dai resti dell'antica vegetazione planiziale (Farnia, Olmo, Acero, Carpino bianco, Frassino, ecc.) offrono alimentazione e luoghi atti alla nidificazione ad alcune specie di uccelli. Altre zone, come i campi non più coltivati o ristrette aree demaniali tendono ad impaludarsi e grazie al ritorno di una certa copertura vegetale (Cannella, Tifa, Pioppo nero, Salice bianco, ecc.) ospitano alcuni uccelli legati agli ambienti umidi.

Elenco in ordine sistematico delle specie osservate

Fam. Podicipedidae

- 1) **Tuffetto** - *Podiceps ruficollis ruficollis* (PALLAS)
Un esemplare trovato morto il 7-12-1973 sulla riva del canale Osellino nei pressi dei giardini pubblici di Mestre.

Fam. Ardeidae

- 2) **Sgarza ciuffetto** - *Ardéola rallòides* (SCOPOLI)
Un esemplare osservato il 23-3-1978 al boschetto di Carpenedo nel quale probabilmente aveva sostato durante la notte.
- 3) **Garzetta** - *Egretta garzetta garzetta* (L.)
Un individuo il 15-9-1974 su una «bricola» del Canal Salso.
- 4) **Airone cenerino** - *Ardea cinerea cinerea* L.
Osservati molto spesso esemplari di questa specie sorvolare il Marzenego e il Canale Osellino, sia in primavera che nella tarda estate.
- 5) **Airone rosso** - *Ardea purpurea purpurea* L.
Come la specie precedente.

Fam. Cicónidae

- 6) **Cicogna bianca** - *Cicònia cicònia cicònia* (L.)
Un esemplare il 24-5-1975 sul Canale Osellino proveniente da Est in volo verso Ovest, a pochi metri di altezza dai tetti delle case. Altra osservazione abbastanza insolita data l'epoca di avvistamento : 4 esemplari sempre sul Canale Osellino nella medesima zona della precedente osservazione il 27-7-1976, questa volta provenienti da Ovest in volo verso Est (era in corso un temporale).

Fam. Pandionidae

- 7) **Falco pescatore** - *Pandion haliæetus haliæetus* (L.)
Un esemplare il 24-5-1975 sul Canale Osellino in prossimità del quartiere di Bissuola. Nella notte c'era stato un forte temporale e l'uccello aveva notevoli difficoltà a proseguire per le continue raffiche di vento.

Fam. Accipitridae

- 8) **Falco pecchiaiolo** - *Pèrnis apivorus* (L.)
Osservato frequentemente durante il passo primaverile anche nel centro urbano ; il più folto gruppo di esemplari, circa una trentina, fu osservato presso Altino il 16-5-1975.
- 9) **Sparviere** - *Accipiter nisus nisus* (L.)
Una femmina il 7-11-1977 in località Asseggiano, in volo da Est verso Ovest.

- 10) **Poiana** - *Buteo buteo buteo* (L.)
Un esemplare il 21-10-1974 in volo nei pressi del campo sportivo di S. Giuliano.

Fam. Falcònidae

- 11) **Lodolaio** - *Falco subbuteo subbuteo* L.
Un individuo nei pressi di Gaggio il 20-5-1973.
12) **Smeriglio** - *Falco columbarius aésolon* TUNSTOLL
Un esemplare il 24-8-77 a Mestre in P. Ferretto mentre insegue un branco di storni; un'altro esemplare il 22-10-78 nei pressi dei giardini pubblici di Mestre.
13) **Gheppio** - *Falco tinnunculus tinnunculus* L.
Comunemente osservato durante i periodi dei passi; sino al secondo conflitto mondiale era specie nidificante all'interno del centro storico.

Fam. Phasianidae

- 14) **Fagiano comune** - *Phasianus colchicus* L.
Osservati esemplari anche nei pressi della immediata periferia cittadina, ma sicuramente originati da «lanci» recenti.

Fam. Gruidae

- 15) **Gru** - *Grus grus grus* (L.)
Osservato un esemplare il 5-12-78 in località Asseggiano alle ore 11,15 in volo da Ovest verso Sud, il tempo era sereno.

Fam. Rallidae

- 16) **Porciglione** - *Rallus aquaticus aquaticus* L.
Un individuo il 27-3-75 in località S. Giuliano nei pressi di un canneto.
17) **Voltolino** - *Porzana porzana* (L.)
Un esemplare trovato morto il 12-4-77 in località Casona in una residua zona palustre, che attualmente è stata colmata.
18) **Gallinella d'acqua** - *Gallinula chloropus chloropus* (L.)
Relativamente comune come nidificante, ciò avviene nei grandi fossi delle polveriere militari.

Fam. Laridae

- 19) **Labbo** - *Stercorarius parasiticus* (L.)
Un individuo il 15-2-74 nei pressi del quartiere Bissuola, mentre volteggiava su una canaletta assieme ad alcuni gabbiani comuni.
20) **Gabbiano comune** - *Larus ridibundus* L.
Frequente sul Canale Osellino, Salso e Marzenego dalla tarda estate all'inizio della primavera.
21) **Gabbiano reale** - *Larus argentatus michahellis* NAUMANN
Come la specie precedente, ma meno frequente e spesso in esemplari isolati.
22) **Mignattino** - *Chlidonias niger niger* (L.)
Osservato frequentemente sul Canale Osellino e Salso, dal mese di maggio a settembre.

Fam. Columbidae

- 23) **Colombaccio** - *Columba palumbus palumbus* L.
Nei periodi di passo branchi di colombacci usano sostare nei parchi delle ville; insidiati, purtroppo, dal bracconaggio notturno.
24) **Colombella** - *Columba oenas oenas* L.
2 individui il 23-3-78 al «Boschetto di Carpenedo»
25) **Tortora dal collare orientale** - *Streptopelia decaocto decaocto* (FRIVALDSZKY)
Un esemplare il 23-4-77 a Carpenedo.

Fam. Cuculidae

- 26) **Cuculo** - *Cuculus canorus canorus L.*
Relativamente comune nelle zone periferiche e agricole.

Fam. Strigidae

- 27) **Civetta** - *Athene noctua noctua (SCOPOLI)*
Ancora relativamente comune sia nelle zone agricole che in periferia ;
1 pullus trovato morto nel centro storico nel giugno 1979.
- 28) **Allocco** - *Strix aluco aluco L.*
Sicuramente nidificante nel parco di una villa presso Asseggiano e
forse a Carpenedo dove abbiamo trovato posatoi e tracce della sua
presenza.
- 29) **Barbagianni** - *Tyto alba alba (SCOPOLI)*
Localizzati almeno due siti di nidificazione su case abbandonate alla
periferia di Mestre. Un tempo era specie nidificante entro Mestre
stessa.

Fam. Apodidae

- 30) **Rondone** - *Apus apus apus (L.)*
Nidificante, purtroppo ha subito un calo notevole a causa dell'impiego
massiccio di insetticidi.
- 31) **Rondone maggiore** - *Apus melba melba (L.)*
Un esemplare morto nel centro di Mestre nel dicembre 1973.

Fam. Alcedinidae

- 32) **Martin pescatore** - *Alcedo atthis atthis L.*
Abbastanza comune; nidifica nei fossati delle polveriere militari.

Fam. Upupidae

- 33) **Upupa** - *Upupa epops epops L.*
Osservata di frequente durante il passo primaverile.

Fam. Picidae

- 34) **Torcicollo** - *Jynx torquilla torquilla (L.)*
Nidificante sia nelle zone agricole che nella periferia cittadina.
- 35) **Picchio rosso maggiore** - *Dendrocopos major Italiae (Stresemann)*
Nidificante, al «Boschetto di Carpenedo» e a «Villa Friedenberg» di
Asseggiano.

Fam. Hirundinidae

- 36) **Topino** - *Riparia riparia riparia (L.)*
Osservato comunemente assieme ai balestrucci nella tarda estate;
un tempo nidificava sulle sponde del Canal Salso.
- 37) **Rondine** - *Hirundo rustica rustica L.*
Compare raramente nel centro urbano; diverse coppie nidificano in
periferia ma risulta essere in forte regresso.
- 38) **Balestruccio** - *Delichon urbica urbica (L.)*
Relativamente comune, anche nella zona urbana dove nidifica.

Fam. Alaudidae

- 39) **Allodola**. - *Alauda arvensis arvensis L.*
Nidificante, osservata come tale nelle zone prative o in quelle abban-
donate della periferia.

Fam. Motacillidae

- 40) **Prispolone** - *Anthus trivialis trivialis* (L.)
Osservato di frequente durante il passo autunnale, anche dentro lo stesso campo sportivo di S. Giuliano.
- 41) **Cutrettola** - *Motacilla flava cinereocapilla* SAVI
Abbastanza comune, anche come nidificante nelle zone periferiche.
- 42) **Ballerina gialla** - *Motacilla cinerea cinerea* TUNSTOLL
Frequente durante l'autunno-inverno.
- 43) **Ballerina bianca** - *Motacilla alba alba* L.
Specie svernante, di cui osserviamo ogni anno coppie nidificanti nella periferia di Mestre.

Fam. Lanidae

- 44) **Averla piccola** - *Lanius colla rio collurio* L.
Nidificante in zona sub-urbana.
- 45) **Averla capirossa** - *Lanius senator senator* L.
Un individuo il 22-4-75 nei pressi del campo sportivo di S. Giuliano.
- 46) **Averla cenerina** - *Lanius minor minor* Gmelin
Osservata una coppia per tutto il mese di giugno-luglio 76 in località «Gazzera Bassa» in caccia in una zona prativa nei pressi di una massicciata ferroviaria nella quale, su una robinia, aveva il nido.

Fam. Oriolidae

- 47) **Rigogolo** - *Oriolus oriolus oriolus* (L.)
Nidificante nella zona sub-urbana e rurale nei pioppeti.

Fam. Sturnidae

- 48) **Storno** - *Sturnus vulgaris vulgaris* L.
Comune come nidificante e ancor più durante il passo quando migliaia di individui scelgono come dormitorio i giardini pubblici cittadini.

Fam. Corvidae

- 49) **Gazza** - *Pica pica gallicae* KLEINSHMIDT
Nidificante in località «Tarù» lungo il fiume Dese nella primavera del 1977 con una coppia.
- 50) **Corvo** - *Corvus frugileus frugileus* L.
Rari esemplari isolati o in compagnia di cornacchie grigie, furono osservati alla periferia di Mestre nell'autunno-inverno 1978.
- 51) **Cornacchia nera** - *Corvus corone corone* L.
Un esemplare a S. Giuliano il 2-2-75.
- 52) **Cornacchia grigia** - *Corvus corone cornix* L.
Osservata di frequente durante i passi.

Fam. Troglodytidae

- 53) **Scricciolo** - *Troglodytes troglodytes troglodytes* (L.)
Specie comune svernante sia nei giardini del centro di Mestre che nella zona periferica.

Fam. Prunellidae

- 54) **Passera scopaiola** - *Prunella modularis modularis* (L.)
Un individuo nei pressi di S. Giuliano il 4-3-76.

Fam. Muscipidae

- 55) **Balia nera** - *Ficedula hypoleuca hypoleuca* (PALLAS)
Osservata comunemente durante il passo sia nelle zone agricole che nei pressi del centro urbano.

- 56) **Pigliamosche** - *Muscicapa striata striata* (PALLAS)
Come la specie precedente.

Fam. Sylviidae

- 57) **Usignolo di fiume** - *Cettia cettii cestii* (TEMMINCK)
Nidificante nelle zone incolte e acquitrinose della periferia.
58) **Cannaiola** - *Acrocephalus scirpaceus scirpaceus* (HERMANN)
Nidificante come la specie precedente.
59) **Cannareccione** - *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* (L.)
Come la specie precedente, ma più diffuso.
60) **Beccafico** - *Sylvia borin borin* (BODDAERT)
Comune, di passo nella tarda estate.
61) **Capinera** - *Sylvia atricapilla atricapilla* (L.)
Comune, nidificante sia in città che in periferia.
62) **Luì piccolo** - *Phylloscopus collybita collybita* (VIEILLOT)
Svernante, anche nei giardini cittadini.
63) **Beccamoschino** - *Cisticola juncidis juncidis* (RAFINESQUE)
Specie nidificante nei campi incolti che tendono ad impaludarsi della periferia.
64) **Regolo** - *Regulus regulus regulus* (L.)
Svernante, anche nei giardini del centro urbano.

Fam. Turdidae

- 65) **Stiaccino** - *Saxicola rubetra* (L.)
Qualche esemplare osservato durante i passi.
66) **Saltimpalo** - *Saxicola torquata rubicola* (L.)
Presente tutto l'anno come nidificante, nelle zone incolte, sulle massicciate ferroviarie, in fossati ecc.
67) **Culbianco** - *Oenanthe oenanthe oenanthe* (L.)
Qualche osservazione in zona sub-urbana durante i passi.
68) **Codiroso spazzacamino** - *Phoenicurus ochrurus gibraltariensis* (GMELIN)
Un individuo a Mestre il 2-11-78.
69) **Codiroso** - *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* (L.)
Frequente durante il passo primaverile.
70) **Pettirosso** - *Erithacus rubecula rubecula* (L.)
Comune dai primi di ottobre alla metà di aprile, frequenta i giardini del centro urbano e della periferia.
71) **Usignolo** - *Luscinia megarhynchos megarhynchos* BREHM
Nidificante nei fossi e nei boschetti delle ville della zona sub-urbana e agricola.
72) **Cesena** - *Turdus pilaris* (L.)
In questi ultimi anni si è fatta decisamente più rara, le osservazioni si riferiscono quasi sempre a esemplari isolati.
73) **Merlo** - *Turdus merula merula* L.
Specie ormai molto comune e nidificante anche nel centro urbano.
74) **Tordo Sassello** - *Turdus iliacus iliacus* L.
Di passo, e svernante in zona sub-urbana.
75) **Tordo** - *Turdus philomelos philomelos* BREHM
Di passo, come sopra.

Fam. Timalidae

- 76) **Basettino** - *Panurus biarmicus biarmicus* (L.)
Un individuo il 15-3-78 nei pressi del centro urbano.

Fam. Aegithalidae

- 77) **Codibugnolo grigio** - *Aegithalus caudatus italiae* JOURDAIN
Specie svernante in zona sub-urbana e osservato come nidificante al «Boschetto di Carpenedo» nella primavera-estate 1976.

Fam. Paridae

- 78) **Cincia mora** - *Parus ater ater* L.
Invernale, durante le giornate particolarmente fredde, anche nel centro urbano.
- 79) **Cinciarella** - *Parus coeruleus coeruleus* L.
Svernante in generale, osservata nidificante a S. Giuliano nella primavera del 1979.
- 80) **Cinciallegra** - *Parus major major* L.
Comune e nidificante sia in periferia che nel centro urbano, dove pone il nido nel cavo degli alberi, ed in particolare nei tigli dei viali.
Fam. Remizidae
- 81) **Pendolino** - *Remiz pendolinus pendolinus* (L.)
Osservato frequentemente nel periodo invernale nelle zone umide della periferia.

Fam. Ploceidae

- 82) **Passera d'Italia** - *Passer domesticus italiae* (VIEILLOT)
Comune, nidificante.
- 83) **Passera mattugia** - *Passer montanus montanus* (L.)
Nidificante nella zona sub-urbana ; mai osservata nel centro urbano.

Fam. Fringillidae

- 84) **Fringuello** - *Fringilla coelebs coelebs* L.
Nidificante, comune nei boschetti e nei viali dell'area sub-urbana e urbana.
- 85) **Verzellino** - *Serinus serinus* (L.)
Comune nel periodo del passo.
- 86) **Verdone** - *Carduelis chloris chloris* (L.)
Nidificante, comune nei boschetti e nei viali dell'area sub-urbana e urbana.
- 87) **Lucherino** - *Carduelis spinus* (L.)
Svernante in zona sub-urbana.
- 88) **Cardellino** - *Carduelis carduelis carduelis* (L.)
Nidificante come il verdone. In questi ultimi anni, si è osservato un sensibile aumento di tale specie.
- 89) **Fanello** - *Achantis cannabina cannabina* (L.)
Osservato durante i passi in area sub-urbana.
- 90) **Frosone** - *Coccothraustes coccothraustes* (L.)
Un individuo a S. Giuliano il 5-5-74.

Fam. Emberizidae

- 91) **Migliarino di palude** - *Emberiza schoeniclus schoeniclus* (L.)
Osservato comunemente durante il periodo invernale nelle bassure acquitrinose ed incolte.

Considerazioni sui dati raccolti

Il totale delle specie da noi osservate, è certamente inferiore a quello reale delle specie di passo e nidificanti nell'area esaminata; del resto basta pensare alla vicinanza di quell'enorme serbatoio di vita animale che è rappresentato dall'estuario Veneto. Ad esempio specie come la folaga *Fulica atra* L., il tarabusino *Ixobrychus minutus* (L.), e il fratino *Caradrius alexandrinus* L., sono sicuramente nidificanti nei pressi dei nuovi quartieri sorti nelle

zone barenose, come l'assiolo *Otus scops* (L.) e il pigliamosche *Muscicapa striata*. (PALLAS), lo sono nei parchi delle ville della periferia.

Altri sono sicuramente di passo come il luì grosso *Philloscopus trochilus* (L.), il luì verde *Philloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN), la peppola *Fringilla montifringilla* L., il fiorrancino *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK).

Altre ancora come il combattente *Philomachus pugnax* (L.) e la pavoncella *Vanellus vanellus* (L.), sono regolarmente svernanti nelle barene alla periferia del centro urbano.

Più in generale numerose specie di Anseriformi e di Caradriformi, amano sostare nelle zone incolte o nei campi allagati durante il periodo dei passi.

Bibliografia

- AZZOLINI A. (1977), Sull'avifauna di alcune cave dell'entroterra Veneziano. *Lavori Soc. Ven. Se. Nat.* 2: 50-55.
- AZZOLINI A. (1980), Le cave. *Boll. LIPU* Primavera 1980.
- BISACCO - PALAZZI (1935), Contributo all'avifauna Veneta. *Boll. Soc. Ven. Stor. Nat ur.* 1 (7-8): 157-166.
- MOLTONI E., BRICHETTI P. (1978), Elenco degli Uccelli Italiani. *Riv. Ital. Orn.* 48: 65-142.
- NINNI E. (1937), Gli uccelli della Laguna Veneta. *S.I.P.S.* . Riunione 26 1-32.
- PRATESI F. (1976), Clandestini in città. *Mondadori*.
- RALLO G.P. (1978), Le casse di colmata della laguna a sud di Venezia. *Lavori Soc. Ven. Se. Nat.* 3: 55-66.